

Bio-glicol[®]

Polietilenglicol + Electrolitos

INDICACIONES

El polvo de **BIOGLICOL[®] CON ELECTROLITOS**, Es un laxante para el tratamiento de estreñimiento en adultos, adolescentes y personas de edad avanzada. No está recomendado para niños por debajo de 2 años de edad ayuda a tener un fácil tránsito intestinal incluso cuando se presenta estreñimiento crónico. También es efectivo en la resolución de la impactación fecal, complicación del estreñimiento severo. Este medicamento contiene potasio, sodio, cloruros, sulfatos y otros minerales para reemplazar los electrolitos que salen del cuerpo con las heces.

Este medicamento está indicado como solución de limpieza oral para el intestino previo a algún procedimiento que requiera de esta condición, un intestino limpio y transparente, como (colonoscopia, cirugía intestinal, estudios radiológicos, etc.).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Disolver el contenido del sobre en un litro de agua, agitando continuamente, hasta completar la disolución del producto.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante, la dosis y forma de uso usual recomendada es:

Preparación: se debe disponer de agua hervida y fría (o tibia). Para 1 litro: disuelva 2 sobres de BIOGLICOL en ½ litro de agua hervida y fría o ligeramente tibia, luego complete a 1 litro con la misma agua. Una vez preparada la solución debe ser enfriada, ya que la solución fría es mejor tolerada por los pacientes, debe ser almacenada para su consumo inmediato en un recipiente con tapa. La dosis a administrar debe ser indicada por el médico, en general, para lograr una adecuada limpieza intestinal debe ingerirse entre 3 y un máximo de 4 litros (entre 6 y 8 sobres). No debe ingerir ningún alimento sólido hasta 2 a 3 horas antes de ingerir la solución y hasta después del procedimiento. Generalmente unas 4 horas antes del procedimiento se debe ingerir entre 200 a 300 ml (1 taza) cada 10 minutos hasta que la diarrea sea clara y no existan desechos, es mejor tomar la solución fría. También se puede tomar la totalidad del volumen requerido partiendo al atardecer del día anterior al examen y continuando en la mañana del día siguiente antes del procedimiento.

CONDICIONES DE VENTA

Venta bajo fórmula médica.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

No se debe administrar a menores de 2 años, ni a pacientes con diagnóstico o con síntomas

sospechosos de obstrucción intestinal (náusea, vómito, dolor abdominal o distensión) de cualquier etiología, o con alergia conocida al Polietilenglicol. Pacientes que presenten hipersensibilidad al Polietilenglicol 3350.

Los pacientes con estreñimiento deben ser evaluados con una historia clínica detallada que incluya un examen físico completo para evaluar las condiciones metabólicas, endocrinas y neurológicas asociadas, así como la medicación concomitante que estén tomando y que pudiera contribuir o agravar la constipación. En algunos pacientes será importante realizar un estudio radiológico o endoscópico del colon. Debe evitarse el uso de Bio-glicol en pacientes con síntomas sugerentes de obstrucción intestinal como: náuseas, vómitos, dolor abdominal o distensión, impactación fecal, estenosis o adherencias intestinales. Además se aconseja no usar este producto en caso de fiebre. Los pacientes deben ser informados sobre hábitos alimenticios y defecatorios adecuados (como dietas con alto contenido de fibra) y cambios del estilo de vida ingesta adecuada de (líquidos y ejercicio regular) con el objetivo de mejorar el funcionamiento intestinal. El uso frecuente, prolongado o excesivo de PEG 3350, puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes. La acción de los laxantes en pacientes con historia clínica de constipación puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal.

Advertencias: Antes de usar este medicamento se deben tomar en cuenta las consideraciones siguientes, las cuales deben ser discutidas entre Ud. y su médico. Alergias: informe a su médico si Ud. ha padecido de reacciones alérgicas o si es sensible a alguna sustancia. Embarazo y lactancia: informe a su médico si Ud. planea embarazarse, está embarazada o amamantando, ya que no existe certeza de los efectos de este medicamento sobre el bebé. Niños: no existe experiencia de uso en niños. Otros: se debe tener especial precaución en pacientes ancianos o si padece de algunas enfermedades, aun cuando no existan signos de ellas en el momento de ingerir el producto (ver Presencia de otras enfermedades).

Efectos Colaterales: El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos

adversos que normalmente no requieren atención médica, a menos que sean demasiado molestos o no desaparezcan durante el curso del tratamiento: Desórdenes gastrointestinales: Muy comunes, >10%: comúnmente hay sensación de plenitud, hinchazón abdominal, náuseas. Comunes (entre 1 a 10%): vómitos, calambres abdominales e irritación anal. Los efectos anteriores son comunes a la ingestión de grandes volúmenes de líquido, si se hacen poco tolerables disminuya la velocidad de ingestión de la solución. Desórdenes en general: Raros (entre 0.1 a 1%): malestar general e insomnio. Desórdenes cardíacos: Muy raros (menor a 0.01% es decir menos de 1 en 10000 habitantes): arritmias cardíacas, taquicardia y edema pulmonar. El balance electrolítico en estos pacientes debe ser monitoreado exhaustivamente. Disminución de la concentración plasmática de calcio. Urticaria, rinorrea o dermatitis. Otros: irritación anal o sensación de ardor, meteorismo (gases).

Interacciones Medicamentosas: El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: Ud. no debe tomar ninguna medicina hasta 2 ó 3 horas antes de la ingestión de Endofalk. Si la medicina que utiliza es esencial, debe evaluar su administración por otra vía con su médico. Ud. no debe mezclar o agregar sustancia alguna a la solución (azúcar, saborizantes, jugos de fruta, etc.) si lo hace altera las propiedades de ésta y pueden aparecer efectos adversos no considerados. Ingiere la solución fría ya que es mejor tolerada.

Sobredosificación: Cualquier medicamento tomado en exceso puede acarrear serias consecuencias. La diarrea severa es probablemente el primer signo de una sobredosis. Disturbios en el balance hídrico y electrolítico, así como en el equilibrio ácido base son esperables sólo con sobredosis severas. En cualquier caso Ud. debe conducir al afectado a un centro asistencial para monitorear balance electrolítico, ácido base y tomar las medidas necesarias para restaurar el equilibrio. En caso de aspiración se puede presentar edema pulmonar que requerirá medidas urgentes.

Información exclusiva para médicos.



Fabricado por:

Quibi S.A. Productos Farmacéuticos Av. Calle 1ª N° 16-71 Bogotá D.C., Colombia
Para: BIOFLUIDOS & FARMA S.A.S. Bogotá D.C., Colombia

www.quibi.com.co